

Syfte: Ex Förbättra patientsäkerheten	Mål: Ex Stöd för medarbetare	Giltighetsområde: Ex Kirurgkliniken
Innehållsansvarig: Ex Ture Test	Beslutsdatum: Ex 2021-10-01	Giltighetstid: Ex 1 år

Rutin för vid behovs ordination av opioid mot smärta under sista levnadsveckan

Syfte

Smärta är vanligt när en patient befinner sig i livets slutskede.

Läkemedel för att lindra smärtan bör därför kunna ges vid behov oavsett när behovet uppstår.

Det bör i första hand ges subkutan och i andra hand intravenöst (om patienten har en intravenös infart). Intramuskulär administrering är ofta smärtsam i detta skede och bör undvikas.

Frekvens

Injicerbar opioid vid behov mot smärta skall ordinerar när ansvarig läkare tagit beslut om att vården övergår till palliativ vård i livets slutskede och/eller haft ett informerande samtal, ett så kallat brytpunktssamtal, där innebörden är att patienten befinner sig i livets slutskede och att vården är inriktad på livskvalitet och symtomlindring.

Ansvar

Ansvarig läkare ordinerar läkemedel.

Utförande

Ansvarig läkare ordinerar vid behovs läkemedel i injektionsform mot smärta i patientens medicinska journal.

Doseringen skall vara individuellt anpassad.

Den ordinerade vid behovsdosen bör vara till opioidnaiva: morfin 10mg/ml 5–10 mg (0,5–1 ml) subkutan vid behov. Justera dosen efter ålder, låg dos till äldre patienter på grund av sämre njurfunktion.

Vid nedsatt njurfunktion kan oxikodon vara ett alternativ.

Mot smärta till patienter med stående opioidmedicinering: ge motsvarande 1/6 av den parenterala dygnsdosen morfin subkutan vid behov.

Observera att olika opioider inte är dosekvivalenta och att 10 mg morfin per os motsvarar 3–5 mg subkutan respektive intravenöst.

Ansvarig läkare förmedlar ordinationen till ansvarig sjuksköterska.

Ansvarig sjuksköterska ser till att läkemedlet finns tillgängligt för patienten som befinner sig i livets slutskede.



Dokumentation

Ansvarig läkare skall ordinera vid behovs läkemedel mot smärta i injektionsform i patientens medicinska journal.

Ansvarig sjuksköterska skall dokumentera i patientens omvårdnadsjournal att vid behovs läkemedel i injektionsform mot smärta är ordinerat.

Avvikelse

Om ansvarig läkare inte ordinerar vid behovs läkemedel i injektionsform mot smärta.

Om ansvarig sjuksköterska inte får tillgång till vid behovs ordinationen.

Om läkemedlet inte finns tillgängligt för patienten som befinner sig i livets slutskede.